



DKC4162

TIMPURIU



MATURITATE RELATIVĂ 91

Maturitatea relativă (RM) este dată de numărul de zile cu temperaturi biologice active, de la răsărit până la maturitatea fiziologică (aparitia punctului negru).

INTERVAL FAO 300-340



Hibrid timpuriu, stabil, cu un start excelent în primăvară

CARACTERISTICI

TIPUL BOBULUI	DENTAT
ÎNFLORIRE	TIMPURIE
VIGOAREA LA RĂSĂRIRE	FOARTE BUNĂ
TOLERANȚA LA SECETĂ ȘI ARȘIȚĂ	BUNĂ
ADAPTABILITATE LA CONDIȚIILE DE MEDIU	FOARTE BUNĂ
VITEZA DE PIERDEREA APEI DIN BOABE	BUNĂ
TOLERANȚA LA CĂDERE A TULPINII LA MATURITATE	FOARTE BUNĂ
TOLERANȚA LA BOLILE ȘTIULETELUI	BUNĂ

DENSITATEA RECOMANDATĂ ÎN FUNCȚIE DE MEDIUL DE PRODUCȚIE*

Maximizează profitul din fermă, alegând densitatea corectă a mediului de producție!

* Mediul de producție reprezintă totalitatea factorilor, de orice natură, ce se regăsesc într-o fermă și care limitează potențialul de producție al hibrizilor de porumb cultivați.

RIDICAT

75.000

boabe germinabile/ha

MEDIU

70.000

boabe germinabile/ha

SCĂZUT

nu se recomandă